

**ИНСТРУКЦИЯ**

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Таурин - СОЛОФарм**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Таурин - СОЛОФарм

**Международное непатентованное наименование (МНН):** Таурин

**Лекарственная форма:** капли глазные

**Состав**

1 мл препарата содержит:

*Активное вещество:* таурин – 40 мг.

*Вспомогательное вещество:* вода для инъекций – до 1 мл.

**Описание**

Прозрачная бесцветная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа**

Метаболическое средство.

**Код АТХ:** S01XA

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе превращения цистеина.

Противокатарактное средство, оказывает метаболическое действие. Стимулирует процессы репарации и регенерации при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением метаболизма глазных тканей.

Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления  $K^+$  и  $Ca^{2+}$ , улучшению условий проведения нервного импульса.

### **Фармакокинетика**

При местном применении системная абсорбция низкая.

### **Показания к применению**

Препарат применяют в составе комплексной терапии. Дистрофия роговицы; катаракта (старческая, диабетическая, травматическая, лучевая); травма роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов). Первичная открытоугольная глаукома (в сочетании с  $\beta$ -адреноблокаторами (для улучшения оттока внутриглазной жидкости)).

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность, детский возраст (до 18 лет).

### **С осторожностью**

Нет данных.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Назначение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Местно. Препарат применяется в виде инстилляций.

При катаракте – по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение 3 месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение 1 месяца.

При открытоугольной глаукоме (в сочетании с бутиламиногидроксипропоксибензоксиметил метилоксадиазолом или тимололом малеатом) по 1-2 капли 2 раза в день за 15-20 минут до назначения одного из местных гипотензивных средств, в течение 6 недель с последующей отменой на 2 недели.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

Если указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

Данные о передозировке отсутствуют.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

У больных глаукомой (открытоугольной) отмечено значительное усиление гипотензивного действия  $\beta$ -адреноблокаторов (бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола или тимолола малеата) в случае совместного применения с таурином.

Усиление эффекта достигается за счет увеличения коэффициента легкости оттока и снижения продукции водянистой влаги.

### **Особые указания**

При необходимости одновременного использования других офтальмологических лекарственных препаратов (глазные капли и др.), интервал между применением таурина и других препаратов должен составлять не менее 10-15 минут.

### **Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на управление автотранспортом и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Капли глазные 4 %.

По 0,4 или 1 мл в тубик-капельницы из полиэтилена низкой плотности или полипропилена.

По 5 или 10 тубик-капельниц в пакете из ламинированной бумаги или без него.

По 2 или 4 пакета с 5 тубик-капельницами или по 1 или 2 пакета с 10 тубик-капельницами, или по 10 или 20 тубик-капельниц вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять после окончания срока годности!

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения**

ООО «Гротекс»

Россия, 195279, Санкт-Петербург

Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87

Факс: +7 812 385 47 88

**Производитель/организация, принимающая претензии**

ООО «Гротекс»

Россия, 195279, Санкт-Петербург

Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87

Факс: +7 812 385 47 88

[www.grotexmed.com](http://www.grotexmed.com)