

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Виксипин**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Виксипин

**Группировочное наименование:** метилэтилпиридинол

**Лекарственная форма:** капли глазные

**Состав**

1 мл препарата содержит:

*Активное вещество:*

Метилэтилпиридинола гидрохлорид 10,0 мг

*Вспомогательные вещества:*

Гидроксипропилбетадекс 20,00 мг

Калия дигидрофосфат 10,80 мг

Натрия бензоат 2,00 мг

Натрия гиалуронат 1,80 мг

Натрия гидрофосфат дигидрат 0,36 мг

Динатрия эдетата дигидрат (трилон Б) 0,20 мг

Фосфорной кислоты раствор 2 М до рН 4,0-5,0

Вода для инъекций до 1 мл

**Описание**

Прозрачная или почти прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антиоксидантное средство.

**Код АТХ:** S01XA

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Препарат снижает проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, стабилизирует мембрану клетки, тормозит агрегацию тромбоцитов, уменьшает

свертываемость и вязкость крови, обладает антиагрегационным и антигипоксическим действием.

### **Фармакокинетика**

Препарат быстро проникает в ткани глаза, где происходит его депонирование и метаболизм. В тканях глаза концентрация выше, чем в крови. Обнаружено 5 метаболитов, представленных дезалкилированными и конъюгированными продуктами его превращения. Метаболизируется в печени. Метаболиты выводятся почками. Связывается с белками плазмы крови в среднем на 42 %.

### **Показания к применению**

- лечение и профилактика воспалений и ожогов роговицы;
- лечение кровоизлияний в переднюю камеру глаза;
- лечение и профилактика кровоизлияний в склеру у лиц пожилого возраста;
- тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей;
- лечение осложнений близорукости;
- диабетическая ретинопатия.

### **Противопоказания**

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Препарат закапывают в конъюнктивальную полость по 1-2 капли 2-3 раза в день. Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания (обычно составляет 3-30 дней) и определяется врачом. При наличии показаний и хорошей переносимости препарата курс лечения может быть продолжен до 6 месяцев или повторяться 2-3 раза в год.

### **Побочное действие**

Возможно ощущение жжения, зуд, кратковременная гиперемия конъюнктивы, местные аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы

заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

### **Передозировка**

Случаи передозировки препарата не описаны.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат не следует смешивать с другими лекарственными растворами.

### **Особые указания**

При необходимости одновременного применения других глазных капель, препарат закапывают последним, после полного всасывания предыдущего лекарственного средства (не ранее, чем через 15 минут).

### **Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами**

Нет данных.

### **Форма выпуска**

Капли глазные 1 %.

По 0,5 мл в тубик-капельницы из полиэтилена низкой плотности или полипропилена.

По 5 тубик-капельниц в пакете из фольгированной пленки.

По 2, 4 или 6 пакетов из фольгированной пленки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

По 5 мл во флаконы стеклянные из прозрачного или коричневого стекла, укупоренные насадками медицинскими с защитными колпачками или без защитных колпачков, укомплектованные насадками-упорами для пальцев или без них.

По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года.

После вскрытия флакона – 1 месяц.

Не применять после окончания срока годности!

**Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

**Владелец регистрационного удостоверения**

ООО «Гротекс», Россия

195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 71, корп. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87

Факс: +7 812 385 47 88

**Производитель/Организация, принимающая претензии**

ООО «Гротекс», Россия

195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 71, корп. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87

Факс: +7 812 385 47 88

[www.solopharm.com](http://www.solopharm.com)