

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

### Перекись водорода

**Регистрационный номер:** ЛП-003455

**Торговое наименование:** Перекись водорода

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Водорода пероксид

**Лекарственная форма:** раствор для местного и наружного применения

#### Состав

100 мл препарата содержат:

*Активное вещество:*

Перекись водорода

от 7,5 до 11 г в зависимости от содержания водорода пероксида в исходной субстанции, эквивалентно содержанию водорода пероксида 3,0 г

*Вспомогательное вещество:*

Вода для инъекций

до 100 мл

#### Описание

Прозрачная бесцветная жидкость.

#### Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство.

**Код АТХ:** D08AX01

#### Фармакологические свойства

##### Фармакодинамика

Антисептическое средство из группы оксидантов. При контакте перекиси водорода с поврежденной кожей или слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, при этом происходит механическое очищение и инактивация органических веществ (белки, кровь, гной).

Антисептическое действие не является стерилизующим, при его применении происходит временное уменьшение количества микроорганизмов.

Обильное пенообразование способствует тромбообразованию и остановке кровотечений из мелких сосудов.

##### Фармакокинетика

Не изучалась.

#### Показания к применению

В комплексной терапии.

Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения.

Для дезинфекции и дезодорирования: стоматит, тонзиллит, гинекологические заболевания.

#### Противопоказания

Гиперчувствительность.

#### С осторожностью

Декомпенсированные заболевания печени и почек, гипертиреоз, герпетический дерматит.

#### Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

#### Способ применения и дозы

Для наружного применения применяют 3 % раствор, местно – для полоскания рта и горла, нанесения на слизистые

оболочки – 0,25 % раствор (3 % раствор разводят водой в соотношении 1:11). Неразбавленный раствор не применяют для обработки слизистых оболочек.

Поврежденные участки кожи или слизистой оболочки обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором препарата. Тампоны следует держать пинцетом. Возможно струйное орошение раневой поверхности.

Порядок работы с полимерной ампулой:

1. Взять ампулу и встряхнуть ее, удерживая за горлышко.
2. Сдавить ампулу рукой, при этом не должно происходить выделение препарата, и вращающими движениями повернуть и отделить клапан.
3. Нажатием на ампулу извлечь раствор.

### **Побочное действие**

Жжение в момент обработки раны, аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

### **Передозировка**

В настоящее время о случаях передозировки не сообщалось.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не изучалось.

### **Особые указания**

Не рекомендуется применять препарат под окклюзионные повязки. Следует избегать попадания в глаза!  
Не применять для орошения полостей!  
Нестабилен в щелочной среде, в присутствии щелочей металлов, сложных радикалов некоторых оксидантов, а также на свету и в тепле. Обработка раны 3 % раствором перекиси водорода не гарантирует защиты от заражения столбняком и другой раневой инфекцией.

### **Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами**

Не изучалось.

### **Форма выпуска**

Раствор для местного и наружного применения 3 %.  
По 5 или 10 мл в ампулы из полиэтилена низкой плотности или полипропилена.  
По 5 или 10 ампул вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.  
Не применять после окончания срока годности!

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения**

ООО «Гротекс»  
Россия, 195279, Санкт-Петербург  
Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А  
Тел.: +7 812 385 47 87  
Факс: +7 812 385 47 88

### **Производитель/организация, принимающая претензии**

ООО «Гротекс»  
Россия, 195279, Санкт-Петербург  
Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А  
Тел.: +7 812 385 47 87  
Факс: +7 812 385 47 88  
[www.solopharm.com](http://www.solopharm.com)